



Ο Μητρικός Θηλασμός είναι το πιο υγιές φαινόμενο για μωρά και μητέρες οποτεδήποτε και οπουδήποτε

Οι καταστάσεις στις οποίες ο Μητρικός Θηλασμός αντενδείκνυται είναι ελάχιστες

Σχεδόν όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι συμβατά με τον μητρικό θηλασμό

Ελέγξτε τη συμβατότητα του Μητρικού Θηλασμού με περισσότερους από 28.000 όρους

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι ενδείξεις του e-lactancia έχουν συντεθεί από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ και ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ της APILAM ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε



Θηλασμός & Φάρμακα

Ένας Συνδυασμός Σχεδόν Πάντα Εφικτός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ

Συνταγογραφούμενα φάρμακα, εμβόλια, φυτοθεραπευτικά (φυτά), ομοιοπαθητικά και άλλα εναλλακτικά φαρμακευτικά σκευάσματα, καλλυντικά, ιατρικές διαδικασίες, ρύποι, μητρικές και βρεφικές ασθένειες και άλλα...

Περισσότερες από 90% των γυναικών χρησιμοποιούν φάρμακα και φυτοθεραπευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; www.e-lactancia.org

1. Εισάγετε τον όρο στο πλαίσιο αναζήτησης

Is it compatible with breastfeeding?

Check the compatibility of Breastfeeding with 25,370 terms

Type your search

2. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει έναν έγχρωμο κωδικό, ένα σχόλιο και βιβλιογραφία



Very Low risk.

Safe. Compatible. Not risky for breastfeeding or infant.

[More information](#)



Low Risk.

Moderately safe. Probably compatible. Mild risk possible. Follow up recommended. Read the Comment.

[More information](#)



High Risk.

Poorly safe. Evaluate carefully. Use safer alternative or interrupt breastfeeding several T½. Read the Comment.

[More information](#)



Very High Risk.

Very unsafe. Contraindicated. Use of an alternative or cessation of breastfeeding.

[More information](#)

3. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, παρά τη χρήση του e-lactancia, επικοινωνήστε μαζί μας στο

elactancia.org@gmail.com

Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη δεν δημιουργούν προβλήματα στο θηλασμό

Εφόσον η χρήση ενός αντιβιοτικού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση μιας λοίμωξης, σχεδόν όλα τα συνήθη χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά είναι συμβατά με το θηλασμό

Όλες οι οδοντιατρικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αναισθησίας, της λεύκανσης των δοντιών, της χρήσης αντιβιοτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, είναι επίσης συμβατές με το θηλασμό

Υπέρηχοι, ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες (MRI) είναι συμβατές με το θηλασμό, ακόμα και με τη χρήση σκιαγραφικών

Η μαστογραφία δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία διακοπής του θηλασμού